




**AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA**

**UOC Direzione Medica  
Materno Infantile**

## **Piastra OSTETRICA**



**Vaccini in gravidanza  
PROTEGGITI per PROTEGGERLO**

## La donna in gravidanza ed il suo bambino

sono i soggetti più vulnerabili ad alcune infezioni, che se contratte in gravidanza risultano associate ad elevata morbosità e mortalità. Inoltre la mortalità infantile riconosce tra le cause più frequenti in epoca neonatale proprio quelle infettive. **Le vaccinazioni** sono quindi uno degli strumenti preventivi più validi, in quanto in grado di prevenire, in modo efficace e soprattutto **SICURO, sia per la madre che per il suo bambino**, lo sviluppo di alcune malattie infettive e le loro complicanze.

Le vaccinazioni esprimono la propria azione non solo sulla donna ma **anche sul feto e il neonato**, attraverso il trasferimento di anticorpi materni attraverso la placenta o l'allattamento materno.

**In particolare i vaccini raccomandati in gravidanza e previsti nel Piano nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 includono:**

- difterite, tetano e pertosse (dTpa)
- influenza

Quanto sono diffuse queste infezioni e che tipo di malattie possono provocare?

## Questi vaccini sono sicuri per me e per il mio bambino?

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato la sicurezza per madre, feto e neonato delle **vaccinazioni per pertosse, tetano, difterite e influenza somministrate in gravidanza**. In particolare: le evidenze scientifiche disponibili **NON** hanno rilevato un'associazione con rischio aumentato per complicanze ostetriche, fetali e neonatali di rilievo in donne sottoposte al vaccino rispetto a coloro che non lo hanno ricevuto.

## Pertosse

è una malattia respiratoria provocata dal batterio *Bordetella Pertussis*, estremamente contagiosa, e **trasmessa per via aerea**. **La gravità è correlata inversamente all'età del soggetto**: nei bambini molto piccoli la malattia può determinare gravi complicanze respiratorie e neurologiche, rappresentando una delle cause di morte più rilevanti nel primo anno di vita.

Le rilevazioni recentemente condotte dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) hanno confermato che la pertosse è diffusa nella popolazione adulta. La pertosse contratta da un adulto può essere trasmessa ai neonati non ancora vaccinati. Dato che non è possibile vaccinare il neonato alla nascita l'unica strategia possibile per proteggerlo è quindi l'immunizzazione passiva mediante vaccinazione materna durante la gravidanza.

## Influenza

è una malattia respiratoria che può manifestarsi in **forme di diversa gravità** e che, in alcuni casi, può comportare il ricovero in ospedale. L'influenza è trasmessa principalmente dalle goccioline diffuse attraverso la tosse o gli starnuti e può anche essere trasmessa attraverso il contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie infette. L'influenza è molto diffusa nella popolazione generale e si presenta con epidemie annuali durante la stagione invernale.

Nella popolazione delle donne gravide l'influenza stagionale aumenta il rischio di ospedalizzazione materna, prematurità, parto cesareo, di stress fetale, basso peso del nascituro e interruzione di gravidanza. Anche nei neonati al di sotto dei 6 mesi di vita l'influenza aumenta il rischio di malattia severa e complicanze.

## Difterite

è una malattia causata dal batterio *Corynebacterium diphtheriae*, **trasmessa per via aerea** e che nella sua forma classica si presenta come malattia a carico delle vie aeree superiori, con, nei casi più sfortunati, la morte per soffocamento. In Italia non sono più stati registrati casi di Difterite dal 1996 ma, dal 2015 ad oggi si è assistito ad un aumento delle segnalazioni di infezione, per un totale di 8 casi segnalati.


**L'immunizzazione con vaccino è l'unica misura efficace di prevenzione della difterite**

## Tetano

è una malattia non contagiosa causata dal batterio *Clostridium tetani*, in grado di produrre una tossina responsabile di spasmi muscolari diffusi, spesso letali.

Il **tetano neonatale** colpisce neonati di madri non vaccinate e viene contratto al momento del taglio del cordone ombelicale con strumenti non sterili o a seguito della mancata adozione di buone pratiche nella cura del moncone ombelicale. L'ultimo caso di tetano neonatale in Italia risale al 1982, ma l'incidenza di tetano in età adulta in Italia è circa 10 volte superiore alla media europea. **Il vaccino è obbligatorio in Italia per tutti i nuovi nati dal 1968** e ha un'efficacia superiore al 95%, ma il titolo anticorpale decresce rapidamente, pertanto è necessario eseguire richiami ogni 10 anni.

## QUANDO e DOVE posso effettuare le vaccinazioni?



Il periodo migliore di somministrazione del **vaccino dTpa**, in gravidanza, è il terzo trimestre, idealmente intorno alla 28° settimana e la vaccinazione viene eseguita gratuitamente presso le sedi vaccinali del Dipartimento di Prevenzione, su prenotazione.

Il **vaccino antinfluenzale** è raccomandato alle donne che all'inizio della stagione epidemica dell'influenza si trovino al secondo o terzo trimestre di gravidanza e viene somministrata gratuitamente dal proprio Medico di Medicina Generale o nelle sedi vaccinali della AULSS 6 senza prenotazione, nel corso della campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale.

Le utenti possono richiedere informazioni e prenotare le vaccinazioni presso i Servizi Vaccinali di afferenza in base alla propria residenza:



### Distretto Alta Padovana

Dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 8.15 alle 9.00 e  
dalle 12.00 alle 13.00

**Sede di Camposampiero** ☎ **049.9822202**

**Sede di Cittadella** ☎ **049. 9424433**

## Distretto Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli e Padova Piovese

Per prenotare rivolgersi a:

### Call Center

➔ **840 000 664** da fisso



➔ **049 823 9511** da cellulare



dal lunedì al venerdì  
dalle 07.30 alle 17.00

Solo per informazioni ☎ **0498214216**

## Distretto Padova Sud

### Ambulatorio vaccinale sede di Conselve

Via Vittorio Emanuele II n. 22. ☎ **049-9598154**

### Ambulatorio vaccinale sede di Este

Via Francesconi n. 2. ☎ **0429-618555**

### Ambulatorio vaccinale sede di Monselice

Via G. Marconi n. 19. ☎ **0429-788380**

### Ambulatorio vaccinale sede di Montagnana

Via Ospedale 5 ☎ **0429-808652**

Il Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino di Padova offre un servizio di vaccinazione secondo le modalità descritte sul sito: <https://www.sdb.unipd.it/servizi/attivita%20assistenziali-specialistiche/area-ostetrico-ginecologica/vaccini>

È possibile vaccinarsi inoltre presso il Servizio di Igiene Pubblica in Via Ospedale 22, Padova.



*Questo opuscolo è stato realizzato mediante analisi delle Linee Guida del Ministero della Salute, delle Linee Guida delle principali Associazioni/Società di Ostetriche e Ginecologi italiane e dei dati dell'Istituto Superiore di Sanità.*



## BIBLIOGRAFIA

**VACCINAZIONI IN GRAVIDANZA:** proteggila per proteggerli.

Documento congiunto redatto dal gruppo di lavoro:

**SIGO, SIMP,**

**AOGOI,**

**AGUI, SITI,**

**SIN,**

**FNOPO,**

**Rete Interaziendale Milano Materna Infantile (RIMMI),**

**Vivere Onlus,**

**Cittadinanzattiva**


**Circolare Ministero della Salute del 07/08/2018**

**“Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza”**



**Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2017-2019:**

**<https://www.salute.gov.it>**



UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Offre **informazioni, indicazioni** sull'organizzazione dell'Azienda,  
riceve **richieste o segnalazioni**.

Fornisce indicazioni sull'**accoglienza dei parenti dei malati**.

L'ufficio è aperto presso:

**Piano Rialzato Monoblocco**

(Azienda Ospedale - Università Padova - Via Giustiniani 2 - 35128 Padova)

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00;

☎ 049 821 3200 - fax 📠: 049 821 3364

✉: [urponline@aopd.veneto.it](mailto:urponline@aopd.veneto.it)

*Aggiornato al 18 febbraio 2020*