

GLICOPIRROLATO (GLICOPIRRONIO BROMURO)



★ *Per cosa viene usato questo farmaco?*

- Questo farmaco viene utilizzato per ridurre la secrezione di saliva.



★ *In quale forma farmaceutica lo trovo disponibile?*

- Soluzione orale

★ *Qual è il modo migliore per somministrare questo farmaco?*

Somministrate questo farmaco attenendovi a quanto prescritto dal pediatra. Leggete tutte le informazioni ricevute e attenetevi rigorosamente alle istruzioni.

→ Soluzione per bocca:

- **Somministrare questo farmaco a stomaco vuoto almeno 1 ora prima o 2 ore dopo i pasti**, in mancanza di indicazioni diverse del vostro medico.
- **Usare il misurino** fornito insieme al farmaco, con attenzione. Se assente, chiedete al farmacista di darvi un dispositivo per misurare questo farmaco.
- Continuate a somministrare questo farmaco a vostro/a figlio/a secondo quanto indicato dal medico, anche se vostro/a figlio/a si sente meglio.



★ *Cosa devo fare se mio/a figlio/a salta una dose?*

- **Somministrare la dose saltata il più presto possibile.**
- **Se è quasi ora della dose successiva, non fate assumere a vostro/a figlio/a la dose saltata e riprendete il normale schema posologico.**
- Non assumete 2 dosi contemporaneamente o dosi extra.



★ *In che modo posso conservare e/o gettare questo farmaco?*

- Conservare a temperatura ambiente in un luogo asciutto.
- Conservare tutti i farmaci in un luogo sicuro. **Tenete tutti i farmaci fuori della portata di bambini e animali.**
- **Gettare via i farmaci non utilizzati o scaduti.** Non gettate nel water né versate nello scarico a meno che non vi venga detto di farlo. Se avete domande su qual è il modo migliore di eliminare questi farmaci, consultate il farmacista. Nella vostra zona potrebbero essere presenti programmi di restituzione dei farmaci.



★ AVVERTENZE PARTICOLARI



Se in vostro/a figlio/a notate uno dei seguenti segni o sintomi che potrebbero essere collegati ad un effetto collaterale, informare prontamente il medico di vostro/a figlio/a o richiedere immediatamente cure mediche:

- Segni di una reazione allergica, come eritema cutaneo, orticaria, prurito, rossore, gonfiore, ponfi, esfoliazione della pelle con o senza febbre, rantolo, oppressione al torace o alla gola, problemi di respirazione, deglutizione o di linguaggio, raucedine insolita o gonfiore della bocca, del volto, delle labbra, della lingua o della gola.
 - Assenza di sudorazione durante alcune attività oppure in presenza di alte temperature.
 - **Difficoltà urinarie (ritenzione urinaria).**
 - Dolore o pressione toracica, battito cardiaco accelerato o battito cardiaco anomalo.
 - **Diarrea o costipazione.**
 - Gonfiore addominale.
 - Dolore e problemi allo stomaco o vomito.
 - Debolezza muscolare.
 - Arrossamenti.
 - Cefalea.
 - Difficoltà a dormire.
-
- a meno che non vi venga detto di farlo. Se avete domande su qual è il modo migliore di eliminare questi farmaci, consultate il farmacista. Nella vostra zona potrebbero essere presenti programmi di restituzione dei farmaci.

Dipartimento Didattico Scientifico Assistenziale
Salute della Donna e del Bambino
UOC HOSPICE PEDIATRICO
Direttore: Dott.ssa Franca Benini
e-mail: hospice.pediatrico@aopd.veneto.it
<https://www.aopd.veneto.it/Hospice-Pediatrico>



UOC FARMACIA
Direttore: Dott.ssa Francesca Venturini
e-mail: farmacia@aopd.veneto.it
<https://www.aopd.veneto.it/Farmacia>

