

LASSATIVI


I lassativi sono sostanze utilizzate per favorire lo svuotamento dell'intestino in caso di **stipsi**, o **stitichezza**. Il loro uso scorretto o l'abuso, possono avere effetti indesiderati che, a seconda del tipo di lassativo utilizzato, possono diventare anche gravi.

Uno dei più utilizzati è il **Macrogol**.

MACROGOL

★ Cosa devo sapere o fare mentre mio/a figlio/a assume questo farmaco?

- Non date questo farmaco a bambini sotto i 12 anni di età senza indicazione del vostro pediatra.
- Alcuni medicinali, come per esempio gli antiepilettici, potrebbero non funzionare con la stessa efficacia se assunti in concomitanza con Macrogol. Pertanto, **non prenda altri medicinali per via orale per un'ora prima e per un'ora dopo aver preso questo medicinale.**



★ In quale forma farmaceutica li trovo disponibili?

Granulato per sospensione orale (bustine) o polvere orale.

★ Qual è il modo migliore per somministrare questo farmaco?

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.



- **Stitichezza:** Una dose di Macrogol corrisponde ad 1 bustina sciolta in 125 ml (1/8 di litro) di acqua. Lo prenda 1-3 volte al giorno, a seconda della gravità della sua stitichezza. Il trattamento con questo farmaco di solito dura circa 2 settimane. Se è necessario assumere il farmaco per più tempo, si prega di consultare il medico. Se la stitichezza è causata da una malattia come il morbo di Parkinson o la sclerosi multipla (SM), o se si prendono farmaci che causano la stitichezza il medico può consigliare di prendere il farmaco per più di 2 settimane. Di solito per il trattamento a lungo termine la dose può essere ridotta a 1 o 2 bustine al giorno.
- **Accumulo di feci dure nell'intestino (fecaloma):** Una dose di 8 bustine al giorno di Macrogol è necessaria per il trattamento del fecaloma. Ogni bustina viene sciolta in 125 ml (1/8 di litro) di acqua. Le 8 bustine dovrebbero essere prese entro 6 ore per un massimo di 3 giorni, se necessario. Se ha un problema al cuore, non prenda più di 2 bustine in un'ora.



- **Come miscelare:** Aprire la bustina e versare il contenuto in un bicchiere. Aggiungere circa 125 ml o un ottavo di litro d'acqua. Mescolare bene fino a quando la polvere non si è dissolta e la soluzione è chiara o leggermente opaca, quindi bere. Se è in trattamento per il fecaloma, è possibile sciogliere il contenuto di tutte le otto bustine insieme in un grande contenitore (in un litro d'acqua). Questo medicinale deve essere assunto per bocca.

Cosa devo fare se mio/a figlio/a salta una dose?

Prenda la dose appena si ricorda di farlo.



★ ***Cosa succede se mio/a figlio/a prende un dosaggio maggiore rispetto a quello indicato dal medico?***

- Ciò può causare forti dolori e lo stomaco gonfio, vomito (malattia) o diarrea.
- Un'eccessiva diarrea può portare a disidratazione. In questo caso, interrompa il trattamento e beva molti liquidi. Se è preoccupato contatti il suo medico o il farmacista.

★ ***In che modo posso conservare e/o gettare questo farmaco?***

- **Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.**
- Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza, che è riportata sulla confezione e sulla bustina. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.
- Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. La soluzione ricostituita di Macrogol può essere coperta e conservata in frigorifero (2-8°C) e deve essere usata entro 24 ore. Getti la soluzione non utilizzata dopo 24 ore.
- Non usi questo medicinale se nota che una qualsiasi delle bustine è danneggiata.
- **Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.** Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Dipartimento Didattico Scientifico Assistenziale
Salute della Donna e del Bambino
UOC HOSPICE PEDIATRICO
Direttore: Dott.ssa Franca Benini
e-mail: hospice.pediaterico@aopd.veneto.it
<https://www.aopd.veneto.it/Hospice-Pediaterico>



UOC FARMACIA
Direttore: Dott.ssa Francesca Venturini
e-mail: farmacia@aopd.veneto.it
<https://www.aopd.veneto.it/Farmacia>

